

<http://www.klosterfrau-marke.de>

Klosterfrau Mobilind Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer

Gebrauchsinformationen

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Mobilind
Franzbranntwein Aktiv Gel
Latschenkiefer

Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer
D-Campher 0,986 g, Latschenkiefernöl 0,394 g

Zur Anwendung bei Erwachsenen und Heranwachsenden über 12 Jahre.

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder nach einigen Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer beachten?
3. Wie ist Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. Was ist Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer und wofür wird es angewendet?

Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer ist ein traditionelles Arzneimittel.

Anwendungsgebiet:

Traditionell angewendet zur Unterstützung der Hautdurchblutung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung. Beim Auftreten von Krankheitszeichen wie z. B. Hautveränderungen sollte ein Arzt aufgesucht werden.

2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer beachten?

Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer darf nicht angewendet werden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen einen der wirksamen oder gegen einen der sonstigen Bestandteile der Gelgrundlage.

Außerdem soll Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer nicht auf geschädigter Haut, z. B. bei Verbrennungen, Sonnenbrand, Ekzemen und offenen Wunden oder bei Haut- und Kinderkrankheiten mit Hautausschlägen (Exanthem), sowie auf der Schleimhaut und am Auge angewendet werden.

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer ist erforderlich.

Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?

Zur Anwendung des Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer soll deshalb bei Säuglingen, Kleinkindern und Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:

Lassen Sie Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer vollständig einziehen und verwenden Sie keine Umschläge, Verbände oder Abdeckungen. Überempfindlichkeitsreaktionen sind möglich.

Nicht im Bereich der Augen auftragen, der Kontakt von Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer mit Augen und Schleimhäuten sowie offenen Wunden sollte vermieden werden. Nach dem Auftragen von Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer sollen die Hände gründlich gereinigt werden.

Bei Anwendung von Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer mit anderen Arzneimitteln:

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Wechselwirkungen sind keine bekannt.

Schwangerschaft und Stillzeit:

Aus Sicherheitsgründen nicht während der Schwangerschaft und Stillzeit anwenden.

3. Wie ist Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer anzuwenden?

Wenden Sie Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer immer genau nach der Anweisung in dieser

Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Wie oft und in welcher Menge sollten Sie Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer anwenden?

Bei Erwachsenen und Kindern über 12 Jahre soll 1 bis 3mal täglich ein ca. 2-3 cm langer Gelstrang Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer angewendet werden. Die Anwendung des Präparates sollte nicht unter abschließenden Verbänden und nicht gleichzeitig mit Wärmeanwendung erfolgen.

Wie sollten Sie Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer anwenden?

Tragen Sie Franzbranntwein Gel Latschenkiefer auf die zu behandelnden Hautpartien auf.

Wie lange sollten Sie Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer anwenden?

Die Dauer der Anwendung ist nicht prinzipiell begrenzt.

Was müssen Sie beachten, wenn Sie die Behandlung unterbrechen oder vorzeitig beenden?

Bei Fortbestehen der Beschwerden befragen Sie Ihren Arzt.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

Sehr häufig: mehr als 1 von 10 Behandelten

Häufig: weniger als 1 von 10, aber mehr als 1 von 100 Behandelten

Gelegentlich: weniger als 1 von 100, aber mehr als 1 von 1000 Behandelten

Selten: weniger als 1 von 1000, aber mehr als 1 von 10 000 Behandelten

Sehr selten: weniger als 1 von 10 000 Behandelten, einschließlich Einzelfälle

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer auftreten?

Sehr selten können an Haut und Schleimhäuten Reizerscheinungen und allergische Reaktionen auftreten. In diesen Fällen sollte das Arzneimittel abgesetzt und ein Arzt aufgesucht werden. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

5. Wie ist Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Das Verfalldatum dieser Packung ist auf der äußeren Umhüllung und dem Behältnis aufgedruckt.

Arzneimittel sollten nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr angewendet werden.

Nach Anbruch ist Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer 1 Jahr haltbar.

6. Weitere Informationen

Was Franzbranntwein Aktiv Gel Latschenkiefer enthält:

100 g Gel enthalten:

Wirkstoffe:

D-Campher 0,986 g

Latschenkiefernöl 0,394 g

Die sonstigen Bestandteile sind:

Ethanol 96 %, Citronenöl, Pfefferminzöl, Rosmarinöl, etherisches Muskatöl, Trometamol, Carbomer 980, gereinigtes Wasser, Natriumsulfat, Chinolingelb (E 104), Patentblau V (E 131).

Inhalt der Packung: Originalpackungen mit 100 g und 150 g Gel.

Pharmazeutischer Unternehmer

MCM Klosterfrau Vertriebsgesellschaft mbH

Gereonsmühlengasse 1-11, 50670 Köln

Tel.: +49 (0) 221 / 16 52-0

Fax: +49 (0) 221 / 16 52-575

DIVAPHARMA GmbH, D-12274 Berlin

Hersteller

Klosterfrau Berlin GmbH, Motzener Str. 41, D-12277 Berlin

Unternehmen der Klosterfrau Healthcare Group

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im

Dezember 2006.

© 2008 Klosterfrau Healthcare Group
Alle Rechte vorbehalten